Monsieur

Jay Reçu votre letre le 23 du mois de may, ala quelle iay trouvé joint vn memoire de Messieurs les Commissaires nommés par lacademie; Voicy ma reponce.

1.° Ces Messieurs Se plaignent que ie nay point voulu Entendre, ny respondre, ala question de Scavoir pourquoy iay Separé le cuir chevelu d'avec le pericrane

Je nay pas fait attention a cet article et ne me Suis attaché a respondre qua la question qui concernoit le pericrane; ne regardant pas la levée du cuir chevelu dune Si grande consequence quon ne le puisse inciser et lever dans les fortes contusions, Sans toucher au pericrane lors quil n'est pas contus, puis que la pratique journaliere nous force de le faire tost ou tard; parce que les vaisseaux lacerés et le Sang Extravasé Sabsedent et Se convertissent En pus malgré les meilleurs resolutifs.

La Raison pour laquelle iay levé le cuir chevelu Sans lever le pericrane, fut que ie nay pas trouvé le pericrane contus, mais adherant a los, lequel Estoit Sain et dans Sa couleur naturelle: ie me contentay de la levée des angles de Lincision en Tesperant comme ie lay marqué Eviter lexfoliation, Si la contusion estoit Simple.

2.° Ces M.^rs disent avoir peine a comprendre ce que iay voulu dire, par ces mots, dentellées, Et vniformes a chacune de Ses Extremités, et que ie me trouve contradictoire a ce Sujet. Par ces mots jentend que la Suture Sagittale est dans Sa forme ordinaire a chaque bout de celle qui forme vne Espece de Suture Squammeuse.

3.° Ces M.^rs me font Encore trois questions 1.° Si ie Suis bien Sur que le chevauchement des parietaux fut reellement vne Suture, ou Si le manque de quelqu'unes des conditions detaillees plus haut, ne me laisse point lieu de douter que la blessure eut part a lembarure des parietaux.

Je Repond que le chevauchement du parietal gauche Sur le droit est reellement vne Suture de meme espece que La Squammeuse au temporal, et non leffet du coup: nous lavons Examinés de tous Sens; Sa jonction estoit adherante a ne pouvoir introduire aucun Stilet dessous.

2.° Si ie Suis assuré que cette dissposition des parietaux ne fut pas la même dans toute letendue de La Suture Sagittale.

Cette dissposition n'estoit pas la même dans toutes letendue de cette Suture, mais Seulement de la longeur dun poulce, et chacune de Ses Extremités estoit dentelée ayant Sa forme ordinaire.

3.° Comment jay Seu que le recouvrement des parietaux, estoit de deux lignes.

Le parietal gauche recouvroit le droit de deux lignes la longeur dvn poulce, Je le Say pour Lavoir

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 45 n° 114

vû jusquau momment que les chairs lont recouvert, lexfoliation a commancé par cette Suture.
Enfin ie persiste a certifier que cette Suture est un vice naturel de conformation, et non Leffet du coup.
Il y a Encore quelque demande dans le cours du memoire que jespere mieux Satiffaire En Envoyant
La figure de cette Suture: du moins ces m.rs formeront telles conjectures quils jugeront apropos.
voyez fig. 1. La fig. 2. est celle de lobservation Suivante que iay Envoyé En abregé.

Coup ala teste, partie moyenne du coronal, avec Lecartement, et Enfonçure dune partie du coronal, ou il y avoit Epanchement de Sang Sur la dure merre guerj par loperation du trepan

Le 13 juin 1725. Neuf heures du Soir, le nommé pierre maillard agé de 26 ans vigneron demeurant a Soignolles en brie, pour lors faisant la moisson chés le S.r canet laboureur au dit Soignolles. le dit canat ayant Eu different avec des ouvriers apartenant a m.r Le comte de coubert: Lun des dits ouvriers Se cacha ala porte du dit canet dans le dessein de Lassommer lors quil Sortiroit de chés luy.
Dans ce momment le dit maillard Sorti, et fut pris pour le dit canet, alors fut frappé vn Seul coup, avec vn parrement de fagost rond et long de trois pieds et demj a la partie Superieure et moyenne du coronal: de ce coup il tomba ala renversse Sans Sentiment, ni mouvement; a mon arrivée jexaminay le dit maillard (qui estoit Encore Sur la place, parce quon le contoit mort) ie trouvay vne tumeur par contusion Sans playe de la grosseur dune boule a jouer au mail Setendante Sur toute la face anterieure du coronal, vn boursouflement des paupieres qui Empeichoit de voir les globes des yeux, toute letenduë de cette tumeur Estant avec Eschimose, vn peu de Sang coulant par le nez, nayant ni Sentiment, ni mouvement, ni respiration aparante, ny battement darteres qua la region du cœur, et il y avoit plus de deux heures que laccident Estoit arrivé; Je le fit porter dans Son lit, le pançay avec leau vulneraire et le Saignay Emplement deux fois dans le cours de la nuit.
Le Lendemain comme le dit canet faisoit informer contre le quidam qui avoit frappé, ie ne pû faire autre chose pendant le cours de la journée que de Saigner encore deux fois Le malade. Le Soir M.r Joanim chirurgien juré royal a brie contre robert Si transporta pour faire Son rapport: nous conclumes Ensembles de faire vne incision cruciolle Sur letenduë de la tumeur, que ie fit a linstant En Sa presence. cette tumeur et lechimose estoient tres considerables, parce que le Sujet avoit la veine preparate tres grosse, et que le coup avoit estoit frappé Selon la longitude de cette veine
Lincision faite ie levaj les quatre angles ainsi que le pericrane qui nestoit point adherant a los de La longeur du coup.

Nous Reconnumes des ce moment malgré labondance du Sang qui couloit quil y avoit Escartement du coronal en deux parties; ie pançay la playe avec le charpi Sec, et ie Saignay le malade vne 5.e fois.

Le 15 au matin ie trouvay le malade persistant dans le coma, cependant le poulx commançoit a Se developper ayant de La fievre, et la respiration estoit devenue aparente: il ne prenoit du bouillon que quelques cuillerées nayant point asses de connoissance pour Lavaller; ie le Saignay vne 6.e fois.

assisté de m.r Ioanim a 5 heures apres midy, ie levaj lapareil de lincision cruciale, ou nous trouvames le coronal divisé en droit et gauche par conformation naturelle de la Suture Sagittale jusqua la racine des os du nez qui Sestoit conservée ainsi quoiquil eust desja 26 ans

Cette Suture faisoit vn Escartement denviron deux lignes, depuis la Suture coronale jusqua la racine des os du nez.

Le costé droit estoit Enfoncé au moins dvne ligne, de Sorte que glissant le doigt le long de los du costé gauche, lon Sentoit les dents comme a vne Scie.

Les Simptosmes primitifs Subsistants, cet Escartement de Suture avec Enfonçure dun costé estants certains et visibles, nous conclusmes quil estoit Evident quil y avoit du Sang Epanché Sur la dure merre, et necessité dappliquer le trepan; ce que ie fist apres avoir preparé mon apareil le mesme Soir.

Jappliquay la courone du trepan a la partie moyenne Environ deux lignes de la Suture Sagittale qui traversoit los coronal, Sur le costé droit et Enfoncé (ayant auparavant Examiné si la partie Estoit assez ferme pour ne pas Enfoncer plus avant par la pesenteur du trepan) parceque ie prejugay que lespanchement devoit estre de ce costé; de plus quil me Seroit plus facile de relever cette partie, et la mettre de niveau au costé gauche, ce qui a reussi.

A La levée de la piece de La courone, il Sorti au moins trois cuillerées de Sang non coagulé, mais vn peu bruni. La dure merre nestoit pas adherante au coronal.

Je passay par le trou de La courone vn Elevatoir, avec le quel ie relevay lenfonçure et mis avec facilité le costé droit de niveau au costé gauche.

Je pançay la playe avec le Sindon trempé dans le miel rosat et le baume blanc, jappliquay la plaque de m.r belloste, ie lay continué 12 jours, jay trempé le Sindon de charpi dans lesprit de vin ainsi que le plumaceau pour couvrir los decouvert, par dessus des bourdonnets mollets pour Soutenir les angles, trempés dans vn digestif Simple, vn plumaceau avec le même digestif, ~~et~~ par dessus le tout lemplatre de betoine et le couvrechef. le malade fut Saignay deux heures apres loperation du trepan.

Le 16. matin le malade estoit Encore dans le coma, avec fievre: je le pançay, il Sorti par louverture du trou de la courone Environ vne cuillerée de Sang de même Espece que le premier Sorti, et je le Saignay vne 8.e fois.

Le Soir il me donna des marques de mieux ayant par intervalle quelque connoissance, et
prenant bien le boüillon. ie le pançay comme cy dessus, il Sortit Environ demi cuillerée de
Sang a peu prés comme cy dessus.
Le 17. je trouvay le malade Sans fievre avec raisonnement juste, ne se Souvenant de rien de
ce qui S'estoit passé, me demandant comment il estoit malade, ce quil avoit a la teste qui
luy tenoit le front Si pesant, il prenoit le boüillon luy meme. ie le pançay comme
cydessus, il se trouva au trou de la couronne demi Sa circonference de Sang meslangée
de pus, que ie tiray avec des fausses tentes, et pendent 15 jours du pus bien loüable apeu
prés en même quantité.
A Legard de Lescartement il a Subsisté, les deux parties du coronal nayant pût Se raprocher.
je ne me Suis point apperceu que les crenelures ou dentelures Se Soient Exfoliées, parce
quau bout de 15 jours de pençements il a cru dans lescartement des pupiles de chairs
qui ont recouvert cette Suture et lescartement dans toutes Sa Longeur; La face du
coronal S'est Exfoliée au bout de 40 et 45 jours par petites parcelles tres minces,
Et la circonference du trou de la Couronne au bout de 50 jours, En une Seulle piece
formant un anneau.
La partie droite du coronal qui Estoit Enfonçée S'est mintenue de niveau au costé gauche.
La Cicatrice fut totallement formée au bout de deux mois Et demi et Le malade
parfaitement guerj
Le dit maillard a joüi dune Santé parfaitte lespace de 3 années, nayant meme ressenti
aucune douleur de teste, aquoy il estoit Sujet avant cet accident, faisant les
travaux ordinaires de Sa vacation: au bout de ce tems il vint a mourir un habitant
de Sa parroisse, il fut requis pour Sonner (chose assés recherchée dans les villages
parce que lon donne bien du vin a boire aux Sonneurs) il brida les cloches, les quelles
Sont tres grosses dans cette parroisse pour en Sonner luy Seul plusieurs a la fois, et
Se mit dessous les cloches, c'est a dire au haut du clocher dans le fort du bruit, ce qui luy a
occasionné tant par le vin, que par le bruit des cloches, une affection comateuse dont
il mourut le lendemain; jaurois Souhaité en faire Louverture mais Sa femme Sy opposa.
Je Laisse a Ces messieurs a former tels conjectures quils jugeront a propos de cette cause
de mort. Jay Lhonneur d'estre avec un tres profond Respect

Monsieur

Votre tres humbles obeissant
Serviteur D'Ella a melun ce 7 juin 1736

n.° 209.



Table de La fig. 1.

A. Los coronal.

B. los parietal droit.

C. los parietal gauche.

D. los occipital.

EE. la Suture coronalle.

FF. la Suture Sagittalle

GG. Espece de Suture Squammeuse, faisant Recouvrement de deux lignes sur le parietal droit.

HH. la Suture lambdoïde.

I. lieu ou le trepan a Esté appliqué.

Le talus estoit Espais de la largeur de La ligne qui forme lespece de Suture ——
Squammeuse marqué GG.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 45 n° 114



Table de la fig. 2.

AA. Los coronal diuisé En droit Et gauche.

B. costé droit de los coronal Enfoncé dune ligne

C. costé gauche de los coronal.

D. los parietal droit

E. los parietal gauche

F. los occipital.

GG. la Suture coronalle

HH. la Suture Sagittalle diuisant los coronal En droit Et gauche, et faisant escartement de deux lignes par le coup, de puis la Suture coronalle jusques aux os de la racine du nez.

II. la Suture Sagittale vnissant les parietaux.

LL. la Suture lambdoïde

M. lieu ou le trepan a Esté appliqué.